

# 소화엔 베나치오액

**[유효성분]** 이 약 1병(20mL) 중 : L-멘톨(KP)8mg, 감초(KP)167mg, 건강(KP)100mg, 육계(KP)150mg, 진피(KP)230mg, 창출(KP)40mg, 현호색(KP)167mg, 회향(KP)150mg **[첨가제(보존제)]** : 벤조산나트륨(KP)12mg **[기타첨가제]** : 고과당, 규소수지, 수크랄로스, 시클로덱스트린시럽, 시트르산, 에데트산나트륨수화물, 에탄올, 자일리톨, 정제수, 폴록사머407, 허벌엡센스디에이 07108 **[성상]** 이 약은 갈색 유리병에 든 특이한 방향을 가진 미황색(연노랑)~황갈색의 액제입니다. **[효능·효과]** 식욕감퇴(식욕부진), 위부팽만감, 소화불량, 과식, 체합, 구역, 구토 **[용법·용량]** 1일 3회 식후에 복용합니다. 복용간격은 4시간 이상으로 합니다. 만 15세 이상, 성인 : 1회 1병(20ml) 어린이 : 1회 만 11세 이상-만 15세 미만 : 2/3병, 만 8세 이상-만 11세 미만 : 1/2병, 만 5세 이상-만 8세 미만 : 1/3병, 만 3세 이상-만 5세 미만 : 1/4병, 만 1세 이상-만 3세 미만 : 1/5병 **[사용상의 주의사항]** 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 만 3개월 미만의 젖먹이에게 투여하지 않습니다. 또 만 3개월 이상이라도 만 1세 미만의 젖먹이는 의사의 진료를 받는 것을 우선으로 하며, 부득이한 경우를 제외하고 복용시키지 않는 것이 바람직합니다. 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 1) 다른 약물을 복용하고 있는 사람. 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성. 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다. 상담 시 이 첨부문서를 소지하십시오. 1) 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우. (저칼륨혈증의 결과로서 근육병증이 나타날 수 있습니다.) 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우. 4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여 하십시오. 5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관 하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관 하십시오. 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오. **[저장방법]** 기밀용기, 실온(1~30°C)보관 **[최신정보확인방법]** 이 케이스 개정 일자(2019.12)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dapham.com)에서 확인할 수 있습니다. \*구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다. \*생약제제이므로 때때로 침전이 생기는 경우가 있지만, 약효는 변함이 없습니다. 잘 흔들어 복용하십시오. **[문의전화]** 080-920-2002 (고객만족팀) **[부작용 보고 및 피해구제 신청]** 1644-6223(한국의약품안전관리원)

제조의뢰자

**동아제약**

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64  
 공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로  
 200-23 (1, 2A, 4A층)

제조사

**(주)보락** 경기도 화성시 양감면 초록로 720-37

**(유)한풍제약** 전라북도 완주군 봉동읍  
 완주신단16로 301~303층, 5층, 봉동로 705

