



(01) 08806265012329

어린이 기침·가래

챔프 코프 Champ 액



[제품명] 챔프코프액

일반의약품

[유효성분] 이 약 100mL 중.

티페피딘시트르산염(KP) 50mg
 d-메틸에페드린염산염(KP) 62.5mg
 구아이페네신(KP) 250mg

[첨가제] 농글리세린, D-소르비톨액, 백당, 수크랄로스, 시트르산, 아스코르브산, 에데트산나트륨수화물, 자몽향, 정제수, 카르복시메틸셀룰로오스나트륨, 조합향료(포도향TF-38688), 프로필렌글리콜

[성상] 포도향이 있는 연한 노란색의 투명한 액제

[효능·효과] 기침, 가래, 천식

[용법·용량] 다음의 회 용량을 일 5~6회 복용합니다. 약 4시간의 간격을 두고 복용합니다. 만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받습니다.

연령	이 약 1회 권장용량	연령	이 약 1회 권장용량
만 2세 이상 - 만 3세 미만	4 mL	만 8세 이상 - 만 11세 미만	10 mL
만 3세 이상 - 만 5세 미만	5 mL	만 11세 이상 - 만 15세 미만	13 mL
만 5세 이상 - 만 8세 미만	6.5 mL	만 15세 이상	20 mL

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 만 3개월 미만의 영아[갓난아기]
 - 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
 - MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오. 다른 진해[기침을 그치게 함]거담제[가래약], 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약[비염]코염]용 경구제, 말미약, 알레르기약, 진정제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 만 3개월 미만의 영아[갓난아기]에는 복용을 피하고 만 3개월 이상인 경우도 만 2세 미만의 영·유아는 의사의 진료를 받아야 하며, 꼭 필요한 경우가 아니면 이 약을 복용시키지 않도록 합니다. 만 2세 미만 영·유아에게 이 약을 투여할 경우 보호자에게 알리고 주의 깊게 모니터링해야 합니다.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염[코염], 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
 - 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 고령자[노인], 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 소아에 대한 투여
만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상함 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
 - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적[충혈되어 붉어짐], 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 불안, 떨림, 불면
 - 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용하십시오.
 - 복용시에는 음주하지 마십시오.



7. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 오용[잘못사용]을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[포장단위] 5mL/포 X 10

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[최신정보확인방법]

이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인 할 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

[문의전화] 080-9202 002(고객만족팀)

[부작용보고 및 피해구제신청] 1644-6223(한국약품안전관리원)

작성연월일 : 2019. 11. 18

CPC50D-9L002

제조·판매자 **동아제약**

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64

공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단로 200-23(1, 2A, 4A층)



소 비 자 중 심 경 영
공정거래위원회 | 한국소비자원