




(01) 08806265009725

어린이 콧물 · 코막힘

참포노즈 Champ 시럽



[제품명] 참포노즈시럽

[일반의약품]

[유효성분] 이 약 100mL 중
클로르페니라민말레산염(KP) 0.02g
슈도에페드린염산염(USP) 0.3g

[첨가제]

농글리세린, D-소르비톨액, 백당, 복숭아향SFL-176014, 수크랄로스, 시트르산, 자몽향, 정제수, 카르복시 메칠셀룰로오스나트륨, 프로필렌글리콜

[성상] 복숭아향이 있는 연한 황색의 투명한 시럽제

[효능 · 효과] 다음 증상의 일시적 완화: 눈의 가려움, 눈물, 콧물, 코 또는 인후(목구멍)의 가려움, 재채기, 코막힘 및 부비동 울혈

[용법 · 용량] 4~6시간마다 다음 용량을 복용하고, 24시간 동안 4회를 넘지 않습니다.

Table with 3 columns: 연령 (Age), 체중 (Weight), 1회 투여량 (Dose). Rows: 2~6세 (11~21kg, 5mL), 6~12세 (22~43kg, 10mL), 12세~성인 (44kg 이상, 20mL)

※만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받으십시오.

[사용상의 주의사항]

1.경고

슈도에페드린 함유 의약품 복용시 급성 전신성 발진성 농포(고름물집)증(AGEP)과 같은 중증(심한증상) 피부 이상 반응이 나타날 수 있습니다. 발열, 홍반(붉은반점), 다수의 작은 농포(고름물집)와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의하십시오.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 모노아민옥시다아제 억제제(MAOI)-우울증, 정신 및 감정장애, 파킨슨병 치료제 중 일부)를 투여 중이거나 투여를 중지한지 2주 이내인 사람
2) 만약 처방약에 모노아민옥시다아제 억제제(MAOI)의 포함 여부를 모를 경우, 이 약 복용 전에 의사나 약사에게 문의하십시오.

3. 다음 환자는 복용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 심장질환, 고혈압, 갑상선질환, 당뇨병, 녹내장, 또는 천식이나 만성기관지염과 같은 호흡장애가 있는 사람
2) 진정제 또는 신경안정제를 복용중인 사람

4. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 권장량을 초과하지 마십시오.
2) 이 약은 특히 어린이에게 흥분상태를 유발시킬 수 있습니다.
3) 이 약은 현저한 졸음을 일으킬 수 있으며 진정제 및 신경안정제의 병용(함께 복용)으로 졸음효과가 상승될 수 있습니다.
4) 불안, 어지러움 또는 불면증이 생기면 이 약의 사용을 중지하고 의사 · 약사와 상의하십시오.
5) 급성 전신성 발진성 농포(고름물집)증(AGEP), 발열, 홍반(붉은반점), 다수의 작은 농포(고름물집)와 같은 중증(심한증상) 피부 이상반응이 나타날 경우 복용을 중지하고 의사나 약사와 상의하십시오.
6) 증상이 7일 이내에 개선되지 않거나, 열이 나는 경우 복용을 중지하고 의사 · 약사와 상의하십시오.
7) 인후(목구멍)통이 2일 이상 지속되거나 두통, 발열, 발진, 구역 또는 구토와 같은 증상이 나타나는 경우 이 약의 사용을 중지하고 의사 · 약사와 상의하십시오.
8) 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통, 직장 출혈 등)이 발현될 경우 이 약의 복용을 중단해야 합니다.

5. 과량투여시의 처치

- 1) 부주의로 과량 복용 시, 즉시 의사 · 약사의 도움을 받으십시오.
2) 아무런 증상이 나타나지 않더라도 즉각적인 의학적 조치를 취하십시오.

6. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받습니다.

7. 저장상의 주의사항


- 1) 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 보관합니다.

[포장단위] 5mL/포x10

[저장방법] 차광기 밀봉기, 25℃ 이하 보관

[최신정보확인방법]

0 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인 할 수 있습니다.
· 이 약을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.
· 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 제품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.



[문의전화] 080-920-2002(고객만족팀) [부작용보고 및 피해구제신청] 1644-6223(한국의약품안전관리원)

작성년월일 : 2019.10.10

CPN50D-9K004

제조 · 판매자 동아제약

본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64
공장 : 충청남도 천안시 서북구 백석공단1로 200-23(1, 2A, 4A층)



소 비 자 중 심 경 영
공정거래위원회 | 한국소비자원