

일반의약품

○ 흉터 치료제 노스카나[®] noscarna

[제품명] 노스카나겔

[유효성분]

이 약 1g 중

헤파린나트륨 (KP) 500I.U

알란토인 (USP) 50mg

덱스판테놀 (USP) 100mg

[첨가제 (보존제)]

파라옥시벤조산프로필 (KP) 1mg

[기타첨가제]

글리세린, 디메티콘, 락트산, 스쿼트허브향 (HF-92304), 에탄올, 정제수, 카보머934P, 트롤아민, 폴리에틸렌글리콜 200

[성상]

흰색의 불투명한 겔제

[효능·효과]

상처 조직의 치료 후 처치(비대상·켈로이드성 흉터, 여드름 흉터, 수술 흉터)

[용법·용량]

성인 및 2세 이상의 소아: 상처 및 주변 피부에 1일 수회(여러 차례) 적용하여 가볍게 마사지 합니다.
성인의 경우에는, 비후성 흉터에 대해서는 전날 두껍게 바르고 붓대로 고정하여, 하루 저녁 동안 적용할 수도 있습니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람 (부위)은 이 약을 사용하지 마십시오.

- 1) 이 약의 구성성분에 과민한 환자
- 2) 6개월 미만의 영아(갓난아기)
- 3) 헤파린에 과민반응 [헤파린유도 저혈소판증(Heparin-induced thrombocytopenia, HIT) 등]을 일으켰거나, 출혈경향 및 저혈소판증이 있는 경우
-) 절개되거나 아물지 않은 상처
- 5) 점막 및/또는 화농(괴음)성 감염 부위
- 6) 임산부

2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 약을 사용하지 마십시오.

이 약의 사용과 직접적으로 관련된 문헌은 없으나, 전신 작용의 헤파린에 대해서는 항응고제(쿠마린, 아스피린, 디피리다몰, 덱스트란, 스트렙토키나제)와 동시 사용 시 출혈의 위험이 증가할 수 있으므로, 항응고제와 동시에 사용하지 않습니다.

3. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.

- 1) 눈주위와 점막에는 적용하지 않습니다.
- 2) 흉터가 태양열이나 광선에 노출되지 않도록 주의합니다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.

수유부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

알레르기 반응

6. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 2~12세 미만 소아의 광범위 부위 적용과 2세 미만 영아(갓난아기)의 적용은 의사의 지시를 따릅니다.
- 2) 붓대의 밀봉 효과로 인해 주성분의 침투가 증가되고 피부 밖으로 배출될 수 없기 때문에 어린이, 특히 영아(갓난아기)에게는 붓대로 고정하여, 하루 저녁 동안 적용하는 방법은 적절하지 않습니다.
- 3) 어린이에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용하십시오.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장방법]

기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위]

10그램/튜브, 20그램/튜브

※ 이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 자사 홈페이지(www.dapharm.com)에서 확인할 수 있습니다.

※ 이 약을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환해 드립니다.

[문의전화] 080-920-2002 (고객만족팀)

[부작용보고 및 피해구제 신청] 1644-6223 (한국의약품안전관리원)

작성일자: 2020.02. 25

NOSD-20B001

[제조·판매자]

Y 동아제약

본사: 서울특별시 동대문구 천호대로 64

공장: 경기도 이천시 경충대로 2946번길 61



공정거래위원회 | 한국소비자원

® 등록상표