

사용상 주의사항

1. 경고

이 매일 세션 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

2. 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 홍피종(급성 전신성 발진성 고열증집중(SAGE)), 스티븐스-존슨 증후군(SSJ), 독성 표피 괴사증(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있습니다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여 주십시오.

3. 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있습니다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 안 됩니다. 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 됩니다.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이 약의 구성성분 다른 해열진통제 3) 약 복용시 천식을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만3개월 미만의 영아(간-이) 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

5. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오. 진해거담제(기침, 가래약), 다른 진기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염, 코염용 경구제, 말약, 알레르기용약)

6. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오. 1) 아황산수소나트륨이 함유되어 있으므로 아황산이나 팔라시와 같은 알레르기를 일으킬 수 있으며, 일부 간수성 환자에서는 생명을 위협할 정도 또는 이보다 약한 천식발작을 일으킬 수 있습니다. 일반 사람에서의 아황산간수성에 대한 총괄적인 빈도는 알려지지 않았으나 낮은 것으로 보이며 아황산간수성은 비천식 환자보다 천식환자에서 빈번한 것으로 나타났습니다. 2) 이 약은 카바페뮴을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

7. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(간-이)가 및 만 15세 미만의 어린이 구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기 증상일 수

있으므로 의사와 상의하십시오) 2) 본인 양친 또는 형제 등이 두드러기 증후군 피부염 기원지 천식 알레르기성비염코엔 편두통 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람 4) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 간상신질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장에 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨소변을 눌렀을 때 통증이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 5) 속쓰림, 위부상복부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 위장, 출혈문제를 가지고 있는 사람 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람) 8) 다음과 같은 기침이 있는 사람 : 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 기침이 동반되는 기침 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

9. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 케이스를 소지하십시오. 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 '발진' 발작증후군이 나타날 경우 2) 구역, 구토, 식욕부진, 변비, 부종(부기), 배뇨소변을 눌렀을 때 목마름(지속적이거나 심한), 어지러움, 불안, 떨림, 불면 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증심한 증상 증상이 나타난 경우 ① 속(아나필락시스) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴압박감과 함께 안색이 창백하고 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다. ② 피부발작증후군 증후군(스티븐스-존슨증후군) : 중독성표피괴사증후군과 고열을 동반하고, 발진발작증후군이 나타날 경우, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 천신포, 입이나 눈점막에 나타날 수 있습니다. ③ 천식 ④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있습니다. ⑤ 기침성 폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타납니다. 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

10. 7.7타이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법 용량을 잘 지켜십시오. 2) 장기간 계속 복용하지 마십시오. 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 4) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 5) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 6) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 7) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 8) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 9) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우 10) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

11. 제조번호 : 12. 사용기한 : 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

PAQ-9J020

신 **산 리피요**



용량 X 개수

~아이서우유호 | 스무

감기 조심하세요~

일반의약품 개봉판매금지



판피린[®] Q^액



동아제약 본사 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64
공장 : 충청남도 천안시 서북구 북서공단1로 200-23 (1, 2A, 4A동)
문의 : 1522-1111 (평일 오전 9시~오후 6시) / 1522-1112 (평일 오후 6시~익일 오전 9시) / 1522-1113 (휴일 및 법정공휴일)

20mL X 5병



감기 조심하세요~

판피린[®] Q^액

20mL X 5병



공정거래위원회 | 한국소비자원

뜨는곳

[유효성분] 이 약 1병(20mL) 중 아세트아미노펜(KP) 300mg 카페인수소물(KP) 30mg 클로르페니라민말린염(KP) 25mg 디-메틸에페드린염산염(KP) 18mg 구이이페네신(KP) 42mg 티피파딘(트리스염산염(KP) 10mg

[성상] 갈색 유리병에 든 미황색 연 노랑~황갈색의 투명한 액체입니다. [효능 효과] 감기, 인플루엔자, 통증 (코막힘, 재채기, 인후(목구멍) 통기침) 가래, 오한, 열, 발열, 발진, 두통, 관절통, 근육통의 완화 [용법 용량] 성인 1회 20mL를 1일 3회, 식후 30분이 복용합니다. [저장방법] 기밀용기 실온(1~30℃) 보관

등록상표